Показания для проведения ботулинотерапии.

Пациентам не обязательно иметь группу инвалидности!

- Мышечные дистонии (блефароспазм (насильственное зажмуривание глаз), оромандибулярная дистония (непроизвольные движения в области рта и н.челюсти), тризм (скрежетание зубами), кривошея (насильственный поворот головы), фокальные и сегментарые мышечные дистонии (патологическое напряжение некоторых мышц, приводящим к нарушениям движения, патологическим позам и установкам конечностей)) и гипекркинезы (тремор, моторные тики).
- Спастический синдром и патологический мышечный гипертонус при инсультах, рассеянном склерозе, черепно-мозговых и спинальных травмах, детском церебральном параличе;
- гемифациальный спазм (ритмичные подергивания лицевой мускулатуры, вследствие сдавления лицевого нерва артерией);
- страбизм (косоглазие)
- нарушение мочеиспускания (нейрогенный мочевой пузырь),
- хроническая мигрень.
- различные болевые синдромы,

Противопоказания к проведению инъекционных процедур:

- Гиперчувствительность, аллергия или индивидуальная непереносимость компонентов препарата
- нервно-мышечные нарушения (миастения, миастеноподобные синдромы и др.)
- патология свертывающей системы крови (гемофилия, тромбоцитопения)
- беременность и период лактации
- острые инфекционные заболевания (в т.ч. герпес в стадии обострения)
- воспалительный процесс в месте инъекции
- детский возраст (до 2 лет)
- одновременный прием миорелаксантов, антикоагулянтов, антибиотиков из группы аминогликозидов, тетрациклина, полимиксина